

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Atsikloviir, 30 mg/g, silmasalv

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on atsikloviiri sisaldav silmasalv ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne atsikloviiri sisaldava silmasalvi kasutamist
3. Kuidas atsikloviiri sisaldav silmasalv kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas atsikloviiri sisaldav silmasalv säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on atsikloviiri sisaldav silmasalv ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine atsikloviir on viirusevastane aine.

Atsikloviiri sisaldavat silmasalvi kasutatakse Herpes simplex'i poolt põhjustatud silma sarvkesta põletiku raviks.

2. Mida on vaja teada enne atsikloviiri sisaldava silmasalvi kasutamist

Ärge võtke atsikloviiri sisaldavat silmasalvi:

- kui olete atsikloviiri või valatsikloviiri või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne atsikloviiri sisaldavat silmasalvi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui te kannate kontaktläätsesid.

Muud ravimid ja atsikloviir

Kuna silmasalvi kasutatakse väikeses annuses ja lokaalselt, imendub seda süsteemselt väga vähe, mistõttu on koostoimete esinemine teiste ravimitega vähetõenäoline. Sellegipoolest teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib ravimit kasutada juhul, kui arst on nii soovitanud. Informeerige arsti, kui olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnapiimaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Manustamise järgselt võib lühiajaliselt (5...10 minutiks) nägemine ähmaseks muutuda, seetõttu ei soovitata kohe pärast salvi manustamist autorooli istuda ega masinatega töötada.

3. Kuidas atsikloviiri sisaldavat silmasalvi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi täpse annuse määrab arst. Tavapärane annus nii lastele kui täiskasvanutele on 10 mm salviriba alumise silmalaua alla 5 korda ööpäevas, iga 4 tunni järel. Pärast sümptomite kadumist tuleb ravi jätkata veel vähemalt 3 päeva.

Ärge ületage arsti poolt määratud annust või selle manustamise sagedust.

SEDA SALVI TOHIB MANUSTADA AINULT SILMA.

Peske käsi enne ja pärast salvi manustamist.

Manustamisel ärge laske tuubi otsikul vastu silma puutuda.

Sulgege pärast salvi manustamist silmad umbes 30 sekundiks.

Manustamise järgselt võib lühiajaliselt (5...10 minutiks) nägemine ähmaseks muutuda.

Kui teil on tunne, et silmasalvi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate silmasalvi rohkem kui ette nähtud

Atsikloviiri sisaldav silmasalv ei ole väikeses annuses allaneelamisel ohtlik.

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on manustanud suu kaudu väga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Kui te unustate silmasalvi manustada

Manustage unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg manustada järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate silmasalvi kasutamise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui kasutate atsikloviiri sisaldavat silmasalvi vastavalt arsti ettekirjutustele, siis kõrvaltoimeid tavaliselt ei esine. Kohe pärast silmasalvi manustamist võib tekkida silmas kerge kipitustunne. Samuti võivad esineda paikseid ärritus- ja põletikunähtud. Väga harva võivad esineda ülitundlikkussähtud (sh allergiline nahaturse ning nõgestõbi).

Kõrvaltoimete tekkides pöörduge kohe arsti poole.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.raviamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas atsikloviiri sisaldavat silmasalvi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloo hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2017.