

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Flufenasiin, suukaudne ravimvorm; parenteraalne ravimvorm

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on flufenasiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne flufenasiini kasutamist
3. Kuidas flufenasiini kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas flufenasiini säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on flufenasiin ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine flufenasiin kuulub antipsühhootiliste ravimite hulka.

Flufenasiini kasutatakse orgaaniliste psüühikahäirete, psüühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäirete, skisofreenia, skisotüüpsete ja luululiste häirete, bipolaarse häire, maniakaalne episoodi e. mania, raske depressiooni, ebastabiilse isiksusehäire ja vaimse alaarengu korral.

2. Mida on vaja teada enne flufenasiini kasutamist

Flufenasiini ei tohi kasutada:

- patsiendil, kes on flufenasiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
- ajuverestoonte väljendunud ateroskleroosi korral
- raske südamepuudulikkuse korral
- neerupealise kasvaja, feokromotsütoomi korral
- maksapuudulikkuse korral
- neerupuudulikkuse korral
- vereloomehäirete korral
- väga raske depressiooni korral

Flufenasiini ei tohi manustada patsiendile, kes on koomas.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on flufenasiini kasutamisel vajalik:

- kui patsient on teadaolevalt ülitundlik teiste fenotiasiinide suhtes
- maksakahjustuse korral
- neerukahjustuse korral
- kui patsiendil on südame rütmihäired või südamehaigus

- kilpnäärme üle- või alatalitluse korral
- kui patsiendil on raske kopsuhaigus
- kui patsiendil on olnud insult
- kui patsiendil on epilepsia, alkoholi võõrutusnähud või ajukahjustus
- Parkinsoni tõve korral
- *myasthenia gravis*'e korral
- eesnäärme suurenemise korral
- kui patsiendil või tema perekonnas on esinenud kitsanurga glaukoomi (teatud silmakäe)
- väga sooja ilma korral. Lisaks tuleb informeerida patsienti, et flufenasiini kasutamise ajal ei ole soovitatav käia saunas, sest kõrge temperatuuri käes viibimine soodustab mõnigate sellele ravimile omaste kõrvaltoimete (uimasus, minestamine) esinemise tõenäosust.
- kui patsient on eakas, eriti kui tal on kalduvus kehatemperatuuri languse tekkeks
- patsiendi puhul, kes puutub kokku fosforit sisaldavate putukamürkidega
- kui patsiendil esinevad tromboosi riskifaktorid või kui patsiendi perekonnas on esinenud tromboosi

Muud ravimid ja flufenasiin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui flufenasiini kasutatakse samaaegselt järgmiste ravimitega:

- kõik skisofreenia ja teiste raskete psühhiaatriliste haiguste korral kasutatavad ravimid, sh liitium
- und soodustavad ravimid ja valuvaigistid
- kõrgvererõhutõve korral kasutatavad ravimid, sh diureetikumid (bendroflumetasiid), AKE-inhibiitorid (kaptopriil), beeta-blokaatorid (sotalool), aga ka teised ravimid nagu guanetidiin ja klonidiin
- südamepuudulikkuse ja südame rütmihäirete korral kasutatavad ravimid, nagu kinidiin ja digoksiin, amiodaroon, prokaiinamiid
- verd vedeldavad ravimid, nagu varfariin
- Parkinsoni tõve korral kasutatavad ravimid, nagu levodopa
- diabeedi korral kasutatavad ravimid
- epilepsia korral kasutatavad ravimid
- depressiooni korral kasutatavad ravimid, sh MAO-inhibiitorid, nagu isokarboksasiid ja fenelsiin, SSRI-d nagu tsitalopraam ja tritsüklilised antidepressandid nagu klomipramiin
- HIV infektsiooni korral kasutatavad ravimid (proteaasi inhibiitorid), nagu amprenaviir ja indinaviir
- eluohtlike allergiliste reaktsioonide korral kasutatavad ravimid, nagu adrenaliin
- dobutamiin, dopamiin
- kõik oksendamist või kõhulahtisust põhjustada võivad ravimid, nt antibiootikumid ja kõhulahtistid
- steroidhormoonid
- lihaslõõgastid
- antikolinergilise toimega ravimid, mida kasutatakse ärritatud soole sündroomi korral, astma korral, uriini pidamatuse korral
- tsimetidiin, mida kasutatakse mao happesuse vähendamiseks
- ravimid, mida kasutatakse vererõhu tõstmiseks, nagu efedriin ja fenüülefriin. Fenüülefriini võib leiduda ka ninakinnisuse korral kasutatavates ravimites.

Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada koos flufenasiiniga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või põhjustada kõrvaltoimeid.

Flufenasiini kasutamine koos toidu, joogi ja alkoholiga

Alkohol

Ärge jooge alkoholi selle ravimi kasutamise ajal, sest alkohol võib võimendada selle ravimi kõrvaltoimeid ja põhjustada tõsiseid hingamisraskusi.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Flufenasiini võib kasutada raseduse ajal ainult juhul, kui ravist saadav kasu ületab võimalikud riskid. Sellisel juhul tuleb kasutada väikseimat võimalikku annust nii lühikese aja vältel kui võimalik. Kui flufenasiini on kasutatud raseduse viimasel kolmandikul võivad vastsündinul esineda järgmised toimed: värisemine, lihaste jäikus või nõrkus, unisus, rahutus, hingamisraskused, söömisraskused. Vastsündinuid, kellel esinevad sellised nähud, tuleb hoolikalt jälgida.

Flufenasiin eritub rinnapiima. Flufenasiini kasutamise ajal ei tohi last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Flufenasiin võib muuta teid uniseks, põhjustada hägusat nägemist ja võib aeglustada teie reaktsiooniirust, seda eriti esimestel ravinädalatel. Seetõttu võib see ravim kahjustada teie autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui teil esinevad sellised kõrvaltoimed.

3. Kuidas flufenasiini kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Flufenasiini täpne annus sõltub patsiendi tervislikust seisundist ja selle määrab igale patsiendile individuaalselt raviarst.

Kui te kasutate flufenasiini rohkem kui ette nähtud

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on võtnud liiga suure annuse seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

Üleannustamise ravi:

Ravi on sümptomaatiline ja toetav. Ekstapüramidaalsete reaktsioonide korral tuleb manustada kas suukaudset või süstitavat parkinsonismivastast ravimit.

Raske vererõhu languse korral võib manustada infusioonina vedelikku ja/või veresooni ahendava toimega ravimit (noradrenaliin). Siiski tuleb silmas pidada, et vasokonstrikorina ei tohi kasutada adrenaliini, sest tulenevalt koostoimest fenotiasiiniga võib see vererõhku veelgi langetada.

Kui te unustate flufenasiini kasutada

Võtke unustatud annus niipea kui võimalik. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate flufenasiini kasutamise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Õelge oma arstile kohe, kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest:

- Järsk kehatemperatuuri tõus või infektsiooni/põletiku tunnused. Need võivad olla valgete vererakkude vähesuse tunnused.
- Verevalumite tekkimine tavalisest kergemini. See võib olla teatud tüüpi vererakkude (trombotsüütide) vähesuse tunnus.
- Trombi tekkimine veenis, suurema tõenäosusega jala veenis. Sümptomite hulka kuuluvad: turse, valu ja punetus haaratud piirkonnas. Veeni tromb on ohtlik, sest see võib liikuda mööda veresooni kopsu ning põhjustada valu rindkeres ja hingamisraskusi. Kui teil tekivad sellised sümptomid, siis pöörduge koheselt arsti poole.
- Liigesvalu, liigeste turse, naha suurenenud tundlikkus päikesele haavandid suus, juuste väljalangemine, ärevus, palavik, öine higistamine, kõhuvalu, rindkere valu, õhupuudus. Need võivad olla raske immuunsüsteemi haiguses süsteemse erütomasoosse luupuse sümptomid.
- Krambid, värisemine, kiire ja ebaregulaarne südame löögisagedus, palavik, lihasjäikus, uriini pidamatus, käte, jalgade ja näo tõmblused.
- Väsimus, uimasus, nõrkus, ebatavaliselt kahvatu nahk ja püsivad infektsioonid. Kui teil tekivad sellised kõrvaltoimed, siis rääkige sellest oma arstile, sest vajalik võib olla teie vere seisundi kontrollimine.
- Hägune nägemine või mingid muud nägemishäired, muutused silma värvis, katarakt, rääkimis- ja neelamisraskused, keele ebavaline liikumine, minestamine, lihasjäikus kätes ja jalgades.

Flufenasiin võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid: suu kuivus, nina kinnisus, kõhukinnisus, uimasus, keskendumisraskused, nahakollasus, kolesterooli taseme tõus veres, vererõhu langus, nahalööve, naha värvimuutused, rindade valulikkus, piima eritumine rindadest, menstruaaltsükli häired, sugutungilangus, jalgade ja hüppeliigeste turse, urineerimisraskused.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas flufenasiini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2017.